

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	Res / Vis	Res / Vis	-
categoria	LC	DD	-

Taxonomia

Aves, Anseriformes, Anatidae.

Tipo de ocorrência

Açores: Residente e invernante.

Classificação

Açores: INFORMAÇÃO INSUFICIENTE – DD

Fundamentação: Não existe informação adequada para avaliar o risco de extinção. Com efeito não são conhecidos parâmetros básicos referentes a esta espécie, como o tamanho da população e tendências de declínio.

Distribuição

Espécie com uma distribuição muito alargada, ocorrendo na Europa desde a Escandinávia até França e a oriente até à Ucrânia. Na Ásia a espécie distribui-se abundantemente pelo Sudoeste Asiático, Ásia Central e Sul da Sibéria até ao Pacífico, a oriente, e até ao Mar Árábico, a sul. Ocorre ainda no Norte de África, na América do Norte e na Groenlândia. A espécie foi introduzida na Bermuda, na Austrália e na Nova Zelândia (Cramp & Simmons 1977).

Nos Açores a espécie ocorre como nidificante, nomeadamente na ilha das Flores, e como invernante (Bannerman & Bannerman 1966).

População

Nos Açores, a espécie nunca foi alvo de estudos ou censos dirigidos e nesse sentido não existem dados sobre a sua abundância a nível regional.

Em termos de estatuto de ameaça a nível da Europa, a espécie é considerada *Não Ameaçada*, embora apresente declínios populacionais pontuais dentro da sua área de distribuição europeia (BirdLife International 2004). Em Espanha, está classificada como *Pouco Preocupante (LC)* (Madroño *et al.* 2004).


Habitat

Ocorre em zonas húmidas.

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758



Pato-real



Factores de Ameaça

A destruição de zonas húmidas e a caça excessiva constituem as principais ameaças para esta população.

Medidas de Conservação

Esta espécie cinegética encontra-se protegida por legislação nacional e internacional no âmbito das normas gerais de protecção das aves e dos seus habitats, não tendo sido alvo de acções específicas de conservação.

As prioridades de conservação incluem a clarificação do estatuto fenológico da população de pato-real que ocorre nos Açores, assim como a obtenção de dados sobre a sua distribuição e abundância a nível regional.

Notas

Em Portugal Continental é uma espécie com populações numerosas e de distribuição alargada, em situação *Pouco Preocupante (LC)*.