

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	Vis	-	-
categoria	VU	-	-

Taxonomia

Aves, Charadriiformes, Scolopacidae.

Tipo de ocorrência

Invernante.

Classificação

VULNERÁVEL – VU (D1)

Fundamentação: Espécie com população reduzida (inferior a 1.000 indivíduos maduros).

Distribuição

Nidifica em várias zonas do Ártico, desde o Alasca, Canadá, Gronelândia, até à Sibéria. As subespécies que ocorrem em Portugal nidificam no Canadá, Gronelândia, e Sibéria central. Inverna no Oeste da Europa, Mediterrâneo e África, e provavelmente na Australásia (del Hoyo *et al.* 1996).

Em Portugal continental ocorre principalmente em zonas húmidas costeiras (Farinha & Costa 1999).

População

Esta espécie tem sido monitorizada nas zonas estuarinas desde a década de 1970. A análise destes censos até 2000 permitiu verificar que a abundância da população tem permanecido estável, oscilando entre 400 e 900 indivíduos (Sousa 2002b).

Em termos de estatuto de ameaça a nível da Europa, a espécie é considerada *Em Declínio*, apresentando um declínio recente moderado (BirdLife International 2004).

Habitat

Zonas húmidas costeiras (salinas, zonas entre-marés).


Factores de Ameaça

Perda ou degradação de habitat (por ação do Homem), nomeadamente abandono ou degradação de salinas, a transformação de salinas em aquacultura marinhas e a destruição ou degradação das zonas entre-marés.

Calidris canutus (Linnaeus, 1758)



Seixoeira



Medidas de Conservação

A maior parte das áreas estuarinas utilizadas por esta população durante o inverno estão incluídas em áreas com estatuto legal (Reservas Naturais, Zonas de Protecção Especial, Sítios Ramsar). Várias outras zonas foram designadas recentemente como *Zonas Importantes para as Aves* (Costa *et al.* 2003).

Deve ser promovida a manutenção da actividade salineira e condicionada a alteração de uso das áreas ocupadas por salinas, também fora de áreas classificadas (*e.g.* estuário do Mondego)

É necessário uma monitorização mais eficaz da espécie, de modo a obter estimativas mais fiáveis da sua abundância.

Notas

Em Portugal continental ocorrem duas subespécies distintas: *Calidris canutus canutus* (predominante) e *Calidris canutus islandica*. A espécie ocorre também como migrador de passagem.