

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	MigRep / Vis / Res	Res / MigRep	Res / MigRep
categoria	LC	DD	LC

Taxonomia

Aves, Galliformes, Phasianidae.

Tipo de ocorrência

Açores: Residente e estival nidificante.

Classificação

Açores: INFORMAÇÃO INSUFICIENTE – DD

Fundamentação: Não existe informação adequada para avaliar o risco de extinção. Com efeito não são conhecidos parâmetros básicos referentes a esta espécie, como o tamanho da população e tendências de declínio.

Distribuição

A distribuição mundial da espécie inclui a Europa, a Ásia e a África. A população europeia tem registado flutuações marcadas, com tendência para a espécie se expandir para norte e para oeste em anos de elevadas abundâncias (Cramp & Simmons 1980).

Nos Açores, a espécie ocorre em todas as ilhas (Bannerman & Bannerman 1966).

População

Nos Açores, a espécie nunca foi alvo de estudos ou censos dirigidos e nesse sentido não existem dados sobre a sua abundância a nível regional.

Em termos de estatuto de ameaça a nível da Europa, a espécie é considerada *Depauperada* embora ainda provisoriamente, tendo apresentado um declínio histórico acentuado (BirdLife International 2004). Em Espanha, foi classificada como tendo *Informação Insuficiente* (DD) (Madróño *et al.* 2004).

Habitat

Ocorre em campos abertos cultivados.

Factores de Ameaça

A caça excessiva constitui a principal ameaça para esta população.

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)



aves

Codorniz



Medidas de Conservação

Esta espécie cinegética encontra-se protegida por legislação nacional e internacional no âmbito das normas gerais de protecção das aves e dos seus habitats, não tendo sido alvo de acções específicas de conservação.

As prioridades de conservação incluem a clarificação do estatuto taxonómico e fenológico da população de codorniz que ocorre nos Açores, assim como a obtenção de dados sobre a biologia de reprodução, distribuição e abundância a nível regional.

Notas

Segundo Bannerman & Bannerman (1966) ocorrem nos Açores as subespécies *coturnix* e *conturbans*, a primeira com estatuto migratório e a outra residente em todas as ilhas do arquipélago.

Em Portugal Continental, onde ocorrem várias populações com fenologia distinta (estival nidificante, invernante, residente), é uma espécie abundante e com distribuição alargada, com estatuto *Pouco Preocupante* (LC). No Arquipélago da Madeira, onde ocorre na Madeira e no Porto Santo, apresenta igualmente o estatuto de *Pouco Preocupante*.