

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	Res	-	-
categoria	VU	-	-

### Taxonomia

Aves, Passeriformes, Emberizidae.

### Tipo de ocorrência

Residente.

### Classificação

VULNERÁVEL – VU (D1)

Fundamentação: Espécie com população reduzida (entre 500 e 1.200 indivíduos maduros).

### Distribuição

Distribui-se de forma contínua pelas regiões temperadas e boreal do Paleártico Ocidental, atingindo zonas montanhosas na região Mediterrânica (Hagemeijer & Blair 1997).

Em Portugal, a espécie ocorre quase exclusivamente no Alto Minho, em particular no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

### População

A população nacional foi estimada como contendo 500-1.200 indivíduos. No Parque Nacional da Peneda-Gerês, principal área de ocorrência da espécie, a população foi estimada em 250 a 350 casais (Pimenta & Santarém 1996). No decorrer dos trabalhos do Novo Atlas (ICN dados não publicados), a espécie foi ainda detectada fora deste Parque, numa área geográfica praticamente equivalente, ou mesmo superior, à da ocorrência no interior da área protegida. Desta forma, assumiu-se que poderia haver no máximo 250 casais fora da Peneda-Gerês.

Em termos de estatuto de ameaça a nível da Europa, a espécie é considerada *Não Ameaçada*, embora ainda provisoriamente (BirdLife International 2004).

### Habitat

Mosaico de áreas de cultivo, *e.g.* centeio, associadas a matos, lameiros, bosquetes e sebes (Rufino 1989, Pimenta & Santarém 1996).

### Factores de Ameaça

Abandono das actividades agrícola e pastoril extensivas.

*Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758



## Escrevedeira-amarela



### Medidas de Conservação

Promoção da agricultura tradicional de forma a permitir a conservação do mosaico paisagístico, particularmente na região do Planalto da Moura. Esta medida contribuirá também para a conservação de outras espécies com estatuto de conservação desfavorável (*Lanius collurio* e *Sylvia borin*).