

	CONTINENTE		AÇORES	MADEIRA
ocorrência	Res	Vis	-	-
categoria	VU	LC	-	-

*Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)



## Escrevedeira-dos-caniços



### Taxonomia

Aves, Passeriformes, Emberizidae.

### Tipo de ocorrência

Residente.

### Classificação

População residente: VULNERÁVEL – VU (D1)

Fundamentação: População reduzida (inferior a 1.000 indivíduos maduros).

### Distribuição

Existem várias subespécies que ocorrem desde a Europa Ocidental até ao Japão e ilha Sacalina, e desde a zona subártica até à zona quente continental da Ásia Central (Hagemeijer & Blair 1997).

Em Portugal, durante a época de nidificação ocorre sobretudo a Norte do Tejo, de forma muito localizada em zonas húmidas litorais, mas também em algumas interiores. A população invernante apresenta uma área de distribuição alargada a todo o continente.

### População

A população nidificante foi estimada como sendo inferior a 1.000 indivíduos maduros. A Ria de Aveiro, com 350-400 casais, deverá albergar a maior parte da população nidificante nacional, onde as densidades podem atingir 7-10 casais/10 ha (J Neto, *com. pess.*). A tendência populacional é desconhecida, mas existem evidências de redução na área de habitat disponível e mesmo de extinções locais, por exemplo no Baixo Mondego (C Pacheco, *com. pess.*).

Embora exista pouca informação sobre a população invernante, esta deverá ser superior a 1.000 indivíduos (J Neto, *com. pess.*), não havendo evidências de declínio continuado.

Em termos de estatuto de ameaça a nível da Europa, a espécie é considerada *Não Ameaçada* (BirdLife International 2004).

### Habitat

Caniçais *Phragmites australis*, juncais *Juncus maritimus*, valas de arroz com vegetação

bem desenvolvida e outras zonas húmidas de água doce ou salobra (Rufino 1989).

### Factores de Ameaça

Drenagem de zonas húmidas, em particular na Ria de Aveiro, e corte de vegetação durante o período de nidificação (Neto 2003)

### Medidas de Conservação

Evitar a drenagem de zonas húmidas. O corte de caniço e junco apenas deverá ser efectuado de Setembro a Fevereiro, inclusivé.

### Notas

Em Portugal Continental tem também uma população invernante numerosa e com distribuição alargada, em situação Pouco Preocupante (LC).