

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	Vis	-	-
categoria	CR	-	-

Taxonomia

Aves, Procellariiformes, Procellariidae.

Tipo de ocorrência

Invernante.

Classificação

CRITICAMENTE EM PERIGO – CR (A3ce+4ce)

Fundamentação: A população mundial concentra-se exclusivamente nas ilhas Baleares (Espanha), pelo que na avaliação do estatuto em Portugal tomou-se como base as informações relativas a estas colónias. Foi registada uma redução muito acentuada nas colónias de nidificação, projectando-se uma redução populacional que possa ser superior a 80% nos próximos 54 anos, como resultado do declínio na qualidade do habitat e por efeito de predação por espécies introduzidas. Ao que tudo indica, a importância destas ameaças não parece ter diminuído.

Distribuição

Trata-se de uma espécie actualmente reconhecida como endémica das ilhas Baleares, embora no passado tenha sido considerada como uma subespécie de *Puffinus puffinus*, conjuntamente com a subespécie nominal e *P.p. yelkouan*. Fora da época de reprodução, concentram-se essencialmente no Golfo da Biscaia (Arcos & Oro 2003). Existem também observações de indivíduos no Sul da Noruega, Polónia, Bélgica, Holanda, Israel, Madeira e Cabo Verde (Cramp & Simmons 1977).

Em Portugal, é regular ao longo de toda a costa (Paterson 1997, Mayol-Serra *et al.* 2000).

População

Ao largo da costa portuguesa, há registos esporádicos de alguns milhares de indivíduos durante o Inverno (Paterson 1997, Mayol-Serra *et al.* 2000).

É uma espécie que em termos de estatuto de ameaça é, globalmente e a nível da Europa, considerada *Criticamente em Perigo* (IUCN 2004a, BirdLife International 2004).

A informação mais recente sugere uma população reprodutora de apenas 1.750-2.125

Puffinus mauretanicus Lowe, 1921



Fura-bucho



casais reprodutores (Arcos & Oro 2003); a estes valores deverá ser acrescentada uma fracção bastante expressiva de aves não-reprodutoras (constituída por indivíduos imaturos e adultos que não se reproduziram). Foi registado um declínio muito acentuado nas colónias de nidificação localizadas nas ilhas Baleares, estimado em ca. 7,6% por ano (Arcos & Oro 2003), projectando-se assim uma redução populacional muito superior a 50% em três gerações (cerca de 54 anos).

Habitat

Nidifica em pequenas ilhas e zonas costeiras, em cinco ilhas do arquipélago das Baleares. À semelhança de outros Procellariiformes, ocupa tocas naturais e fendas nas rochas, em colónias onde ocorrem igualmente Hidrobatídeos e Cagarras *Calonectris diomedea*. Alimenta-se essencialmente de peixe, parecendo aproveitar rejeições de barcos de pesca, pelo menos durante parte do ano (referências em Arcos & Oro 2003).

Factores de Ameaça

A população nidificante é muito localizada, sendo por isso muito susceptível a predadores terrestres (designadamente ratos e gatos), também o crescimento urbanístico limita o habitat de nidificação disponível (Arcos & Oro 2003). As ameaças potenciais à população invernante incluem a morte em artes de pesca, que podem ter efeitos muito nefastos se envolveram aves adultas. À semelhança de outras aves marinhas, são naturalmente muito vulneráveis a poluição extensiva por hidrocarbonetos e à sobrepesca.



Puffinus mauretanicus Lowe, 1921

Fura-bucho

Medidas de Conservação

No sentido de minimizar os factores de ameaça, é recomendável a definição das áreas marinhas de ocorrência regular desta espécie, e nestas áreas efectuar uma avaliação das actividades de pesca potencialmente lesivas e um seguimento mais atento dos riscos de derrames de hidrocarbonetos.