

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	-	Res / End	-
categoria	-	CR	-

Regulus regulus sanctae-mariae Vaurie, 1954



Estrelinha-de-poupa, Estrelinha (Açores)



Taxonomia

Aves, Passeriformes, Sylviidae.

Tipo de ocorrência

Residente. Endémico dos Açores.

Classificação

CRITICAMENTE EM PERIGO – CR (B1ab(iii))

Fundamentação: População confinada à ilha de Santa Maria, com uma extensão de ocorrência bastante restrita (inferior a 100km²), a que pode corresponder apenas 1 localização; tem sofrido declínio continuado da extensão e da qualidade do habitat.

Distribuição

Regulus regulus sanctae-mariae encontra-se confinada à ilha de Santa Maria, no Grupo Oriental (Bannerman & Bannerman 1966).

Nos Açores foram descritas três subespécies distintas da espécie *Regulus regulus*: *azoricus* restrita à ilha de São Miguel, *sanctae-mariae* restrita à ilha de Santa Maria e *inermis* distribuída pelas ilhas das Flores, São Jorge, Terceira, Faial e Pico.

População

Não existem informações pormenorizadas sobre a distribuição e a abundância desta subespécie. No entanto, com base na informação disponível para a subespécie *inermis* (Melo 1998), admite-se que a sua população será superior a 10.000 indivíduos maduros. Com efeito, na ilha do Pico foram referidas densidades de estrelinha entre 0,52 e 10,78 casais/ha, de acordo com os diferentes tipos de biótopo (Melo 1998).

Em termos de estatuto de ameaça a nível da Europa, a espécie é considerada *Não Ameaçada* (BirdLife International 2004).

Habitat

Nos Açores, ocupa preferencialmente zonas de mato misto e mato de folhado *Viburnum tinus* e urze *Erica azorica*, nidificando em urzes e em cedros-do-mato *Juniperus brevifolia* (Bannerman & Bannerman 1966).

Factores de Ameaça

A substituição em larga escala de áreas de floresta natural por zonas de pastagem e a rápida expansão de algumas espécies de plantas exóticas invasoras constituem as principais ameaças para esta população.

Medidas de Conservação

A estrelinha encontra-se protegida por legislação nacional e internacional no âmbito das normas gerais de protecção das aves e dos seus habitats, não tendo sido alvo de acções específicas de conservação. No entanto, organizações locais de ambiente têm realizado acções de sensibilização sobre a avifauna que nidifica na ilha de Santa Maria, divulgando em particular a estrelinha.

As prioridades de conservação para esta espécie incluem a clarificação do estatuto taxonómico das populações de estrelinha, nomeadamente através da análise dos padrões biométricos, bioacústicos e de variabilidade genética.

Notas

As outras duas subespécies que ocorrem nos Açores, *R. r. inermis* e *R. r. azoricus* encontram-se em situação *Pouco Preocupante* (LC).

A espécie ocorre também como invernante no Continente, onde apresenta população numerosa e com distribuição alargada, classificada como *Pouco Preocupante* (LC).